



CONTATTO STRETTO

Le indicazioni riportate schematicamente di seguito si applicano ai contatti stretti avvenuti in comunità. Si ricorda che i contatti nel contesto scolastico seguono indicazioni diverse specifiche per tale ambito.

VACCINATI O GUARITI
Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni

AUTO-SORVEGLIANZA

Auto-monitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti

UTILIZZO MASCHERINA FFP2 in tutti gli ambienti frequentati



Ultimo contatto stretto

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test



Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).


VACCINATI (O GUARITI)
da più di 120 giorni e con Green Pass valido

QUARANTENA BREVE



Ultimo contatto stretto

Fine quarantena con test negativo (molecolare o antigenico)



In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test




Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

NON VACCINATI
Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni

QUARANTENA COMPLETA



Ultimo contatto stretto



Fine quarantena con test negativo (molecolare o antigenico)

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test



Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire APPENA POSSIBILE alla campagna vaccinale

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).



POSITIVO A COVID-19

Il presente schema riporta le indicazioni standard. In presenza di sintomatologia è sempre opportuno fare riferimento al proprio medico curante per il monitoraggio delle condizioni di salute.

VACCINATI (o GUARITI)

Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni

POSITIVO SENZA SINTOMI



POSITIVO CON SINTOMI




* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi.
 ** Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2°, 3° o 4° generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo almeno 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.

NON VACCINATI

Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni o vaccinati con ciclo primario completo da più di 120 giorni

ISOLAMENTO



Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire **APPENA POSSIBILE** alla campagna vaccinale

* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi
 ** Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2°, 3° e 4° generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.